

TOMOCICHLA SIEBOLDII



Famille : Cichlidés

Genre : Tomocichla

Espèce : Sieboldii

Espèce découverte par KNER et STEINDACHNER en 1864

Autrefois ce cichlidé de la section Theraps était classé dans le genre Heros.

Puis, en 1908, Regan le plaça dans le genre des Paraneetroplus.

Les synonymes sont:

- Herichthys underwoodi (Regan 1906)
- Cichlasoma punctatum (Meek 1909)
- Theraps terrabae (Jordan et Evermann 1927)

Répartition géographique :

Cette espèce se trouve dans deux pays d'Amérique Centrale sur les côte pacifique du

- Costa Rica (Rio Aranjuez, Rio Barranca, Rio Turrubaritos, Rio Parrita, Rio Terraba, Rio Coto.)
- Panama (Rio Chiriqui Viero.)

Milieu Naturel:

Ces cichlidés colonisent les biotopes les plus variés. Trouvés aussi bien dans des rivières à eaux courantes que stagnantes de la région Esparta (Rio Jesus Maria, Rio Barranca) qui se situe a la limite ouest. La frontière étant constituée par le secteur du Rio San Pedro, au Panama. Ils s'accommodent très bien à la dureté de l'eau et au Ph. La nourriture de ce Cichlidé végétarien provient de la végétation terrestre (algue, herbe, feuille, graine). En complémentarité, ils peuvent ingérer des insectes aquatiques et leurs larves, ainsi que des crevettes.

Description:

Sur un fond gris à gris-jaune ces cichlidés présentent des barres et une ligne noire sur le bas du corps. Parfois apparaissent des reflets rouges mais en lumière naturelle, c'est un festival de rouge, bleu et jaune. Cette espèce étant isomorphe, mâles et femelles ne peuvent que difficilement être distingués, toutefois les femelles sont reconnaissables à leur énorme tâche noire dans la partie épineuse de la dorsale. Lors de la reproduction, le ventre de la femelle et du mâle noircit et le reste du corps et blanc.

Sa taille fait 20 cm environs.

Reproduction:

Si cette espèce est tenue dans des bonnes conditions, elle n'est pas difficile. C'est un pondeur sur substrat caché qui pond sur des pires ou des racines. Les deux parents soignent et défendent les oeufs, les larves, et les alevins. Les alevins devront être nourris avec des paillettes réduites en poudre et avec des nauplies d'artémias. Cette espèce défend ardemment sa progéniture jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille importante. Les reproductions passantes, ces cichlidés colonisent un territoire de plus en plus important. Les jeunes ne s'en éloignent pas trop.

Comportement:

Calme, paisible.

Espèce semblable:

Tomocichla tuba (Meek 1912)

dans la famille des Tomocichla on trouve aussi Tomocichla asfraci

Bibliographie :

Gibert Philippe et Gobeaux Bernard. 2005. *Cichlidés d'Amérique centrale*. s.l. : Association France Cichlid, 2005. 2-9513502-3-6.

Wolfgang Staeck et Horst Linke 1992. *Cichlidés américains 2, espèce de grande taille*. Copyright 1992 Tetra-Verlag 3-89356-147-1

par Mickael Le bris